Structuration multi-échelles de la biodiversité des monts sous-marins et pentes des îles, en domaine bathyal : approche méthodologique

Mélissa HANAFI PORTIER

Melissa.Hanafi.Portier@ifremer.fr

Directrices de thèse :

Dr. Karine OLU,
Karine.Olu@ifremer.fr

Pr. Sarah SAMADI,
sarah.samadi@mnhn.fr

Projet cofinancé par TOTAL et Ifremer dans le cadre du projet scientifique PAMELA (Passive Margin Exploration Laboratories).

Contexte général

- **Monts sous-marins** >1000m (knolls > 100m) (Yesson et al., 2011), origine volcanique.

- Paradigmes écologiques: biomasse, endémicité, hotspot de biodiversité.

→ **Approfondir les études.**

→ **Nouvelle hypothèse:** communautés de mégafaune benthique (~>2cm) **structurellement distinctes** (vs. autres habitats profonds). (Rowden et al., 2010a ; Rowden et al., 2010b ; O'Hara et al., 2008 ; McClain et al., 2009 ; Howell et al., 2010)

Contexte général

- **Monts sous-marins** >1000m (knolls > 100m) (Yesson et al., 2011), origine volcanique.

- Paradigmes écologiques: biomasse, endémicité, hotspot de biodiversité.

→ **Approfondir les études.**

→ **Nouvelle hypothèse:** communautés de mégafaune benthique ($\sim > 2\text{cm}$) **structurellement distinctes** (vs. autres habitats profonds). (Rowden et al., 2010a ; Rowden et al., 2010b ; O'Hara et al., 2008 ; McClain et al., 2009 ; Howell et al., 2010)

- **Structuration multi-échelles spatiales par divers facteurs:**

REGIONALE

(T°, [O₂], POC, profondeur, latitude, hydrodynamisme, masses d'eau, [chl_a], distances à la côte, etc.)

Contexte général

- **Monts sous-marins** >1000m (knolls > 100m) (Yesson et al., 2011), origine volcanique.

- Paradigmes écologiques: biomasse, endémicité, hotspot de biodiversité.

→ **Approfondir les études.**

→ **Nouvelle hypothèse:** communautés de mégafaune benthique (~>2cm) **structurellement distinctes** (vs. autres habitats profonds). (Rowden et al., 2010a ; Rowden et al., 2010b ; O'Hara et al., 2008 ; McClain et al., 2009 ; Howell et al., 2010)

- **Structuration multi-échelles spatiales** par divers facteurs:

REGIONALE

(T°, [O2], POC, profondeur, latitude, hydrodynamisme, masses d'eau, [chl_a], distances à la côte, etc.)

LOCALE

Imbrication des échelles

(géomorphologie, topographie (pente/sommet), mosaïques d'habitats biogéniques (coraux, éponges), microreliefs)

+ **facteurs biologiques intrinsèques.**
(capacité de dispersion, stratégie de reproduction, etc.)

Contexte général

- Structuration des communautés de mégafaune benthique en relation avec **l'hétérogénéité de l'habitat**.
 - Peu d'études **quantitatives** et à **fine échelle**.
 - Besoin d'explorer un + large gradient bathymétrique.
 - **Peu de monts explorés (<300) → Océan Indien.**

(Clark et al., 2010 ; Rowden et al., 2010a)

- Caractérisation des habitats/mégafaune profonds par **l'imagerie** (ROV, AUV, caméra tractée):
 - Faible résolution taxonomique, biais/erreur d'identification.
 - Dev. de **méthodologie complémentaire: collecte physique + image**, substrat dur (Williams et al., 2015; Biesegel et al., 2017), meuble. (Nybakken et al., 1998)

Figure 5

Seamounts for which SeamountsOnline (<http://seamounts.sdsc.edu>) has species occurrence information. Circle size is proportional to the number of species records, a proxy for sampling intensity, with sizes scaling from 1 to 1500 records. CenSeam has identified priority regions for future research due to undersampling: Indian Ocean, western and southern central Pacific, and southern Atlantic.

Clark et al., 2010

Contexte général

- Structuration des communautés de mégafaune benthique en relation avec **l'hétérogénéité de l'habitat**.
- Peu d'études **quantitatives** et à **fine échelle**.
- Besoin d'explorer un + large gradient bathymétrique.
- **Peu de monts explorés (<300) → Océan Indien.**

(Clark et al., 2010 ; Rowden et al., 2010a)

- Caractérisation des habitats/mégafaune profonds par **l'imagerie** (ROV, AUV, caméra tractée):
- Faible résolution taxonomique, biais/erreur d'identification.
- Dev. de **méthodologie complémentaire: collecte physique + image**, substrat dur (Williams et al., 2015; Biesegel et al., 2017), meuble. (Nybakken et al., 1998)

Figure 5

Seamounts for which SeamountsOnline (<http://seamounts.sdsc.edu>) has species occurrence information. Circle size is proportional to the number of species records, a proxy for sampling intensity, with sizes scaling from 1 to 1500 records. CenSeam has identified priority regions for future research due to undersampling: Indian Ocean, western and southern central Pacific, and southern Atlantic.

Clark et al., 2010

2 projets: MNHN, ifremer +

- **TOTAL: PAMELA** → Exploration de 5 monts dans le canal du Mozambique.

- **TAAF: BIOMAGLO** → Exploration des pentes externes de l'île Mayotte.

Campagnes d'échantillonnages

PAMELA (Pamela-Moz01 et Moz04)

- 5 monts, 10° latitude, 300 – 880m
- Transects images (1 photo/30s)
- Collectes (drague, chalut)
- CTD, courantomètre, POC,
- SMF: bathy. (10m), réflectivité

Campagnes d'échantillonnages

PAMELA (Pamela-Moz01 et Moz04)

- 5 monts, 10° latitude, 300 – 880m
- Transects images (1 photo/30s)
- Collectes (drague, chalut)
- CTD, courantomètre, POC,
- SMF: bathy. (10m), réflectivité

BIOMAGLO: approche multi-échelles sur les pentes de Mayotte.

- 3 transects (PL), 500-1200m
- Effort d'échantillonnage + robuste
- Approche complémentaire: images + collectes
- CTD, courantomètre, POC (2 pentes),
- SMF: bathy. (20m), réflectivité

Campagnes d'échantillonnages

PAMELA (Pamela-Moz01 et Moz04)

- 5 monts, 10° latitude, 300 – 880m
- Transects images (1 photo/30s)
- Collectes (drague, chalut)
- CTD, courantomètre, POC,
- SMF: bathy. (10m), réflectivité

BIOMAGLO: approche multi-échelles sur les pentes de Mayotte.

- 3 transects (PL), 500-1200m
- Effort d'échantillonnage + robuste
- Approche complémentaire: images + collectes
- CTD, courantomètre, POC (2 pentes),
- SMF: bathy. (20m), réflectivité

Caméra tractée (SCAMPI)

Campagnes d'échantillonnages

PAMELA (Pamela-Moz01 et Moz04)

- 5 monts, 10° latitude, 300 – 880m
- Transects images (1 photo/30s)
- Collectes (drague, chalut)
- CTD, courantomètre, POC,
- SMF: bathy. (10m), réflectivité

BIOMAGLO: approche multi-échelles sur les pentes de Mayotte.

- 3 transects (PL), 500-1200m
- Effort d'échantillonnage + robuste
- Approche complémentaire: images + collectes
- CTD, courantomètre, POC (2 pentes),
- SMF: bathy. (20m), réflectivité

- (1) Décrire la structure spatiale de la biodiversité aux échelles régionale et locale.
- (2) Identifier les facteurs environnementaux structurants à ces échelles, et leurs imbrications.

Campagnes d'échantillonnages

PAMELA (Pamela-Moz01 et Moz04)

- 5 monts, 10° latitude, 300 – 880m
- Transects images (1 photo/30s)
- Collectes (drague, chalut)
- CTD, courantomètre, POC,
- SMF: bathy. (10m), réflectivité

BIOMAGLO: approche multi-échelles sur les pentes de Mayotte.

- 3 transects (PL), 500-1200m
- Effort d'échantillonnage + robuste
- Approche complémentaire: images + collectes
- CTD, courantomètre, POC (2 pentes),
- SMF: bathy. (20m), réflectivité

Prog. Xe FED (gestion TAAF) → plan de gestion / conservation de la zone Mayotte-Glorieuse.

Lacune des données biodiversité des habitats marins profonds dans la zone.

Campagnes d'échantillonnages

PAMELA (Pamela-Moz01 et Moz04)

- 5 monts, 10° latitude, 300 – 880m
- Transects images (1 photo/30s)
- Collectes (drague, chalut)
- CTD, courantomètre, POC,
- SMF: bathy. (10m), réflectivité

BIOMAGLO: approche multi-échelles sur les pentes de Mayotte.

- 3 transects (PL), 500-1200m
- Effort d'échantillonnage + robuste
- Approche complémentaire: images + collectes
- CTD, courantomètre, POC (2 pentes),
- SMF: bathy. (20m), réflectivité

MNHN Paris: prog. Tropical Deep Sea Benthos

Nombreuses collectes
→ connaissance du pool régional d'espèces

(3) Développer une méthodologie intégrée (image + collecte) pour améliorer l'identification sur les images.

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification géomorphologique sous ArcGIS 10.7

Indices de variabilité du terrain (dérivés de la bathymétrie, res. 10m).

- Aspect, Rugosité, Pente, Courbure (éch. 30m)
- BPI* (30m - 500m) → différentes échelles de structure géomorphologique.

* *Bottom Position Index.*

BPI 60m: rides sédimentaires

Mont Sakalaves

BPI 250m: crêtes

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification géomorphologique sous ArcGIS 10.7

Indices de variabilité du terrain (dérivés de la bathymétrie, res. 10m).

- Aspect, Rugosité, Pente, Courbure (éch. 30m)
- BPI* (30m - 500m) → différentes échelles de structure géomorphologique. * *Bottom Position Index.*

Classes semi-automatiques de structure géomorphologique: dictionnaire de classification (BTM)

Table 3. Classification table used for creation of Figure 8. Missing values indicate that the bound is not applicable to the benthic zone.

Class	Zone	Broad BPI (Lower)	Broad BPI (Upper)	Fine BPI (Lower)	Fine BPI (Upper)	Slope (Lower)	Slope (Upper)	Depth (Lower)	Depth (Upper)
1	Reef Crest	-87	541	-907	2229	11	-2		
2	Back Reef	-87	541	-459	885	52	-6		
3	Bank or Shelf	-402	699	-1355	4469	74	-18		
4	Reef Flat	-9	541	-459	1333	67	-8		
5	Channel	-323	384	-907	1333	53	-12	-1	
6	Fore Reef	-323	541	-1355	2229	61	-14		
7	Lagoon	-166	463	-459	1333	49	-7		
8	Salt Pond	-9	-9	-11	-11	53	-7		
9	Shoreline Intertidal	-9	384	-11	436	19	-2		

Walbridge et al., 2018

→ Résultats peu fructueux.

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification géomorphologique sous ArcGIS 10.7

Indices de variabilité du terrain (dérivés de la bathymétrie, res. 10m).

- Aspect, Rugosité, Pente, Courbure (éch. 30m)
- BPI* (30m - 500m) → différentes échelles de structure géomorphologique.

* *Bottom Position Index.*

↓
Classes manuelles de structure géomorphologique

- Réflectivité (roche/meuble)
- Pente
- Validation terrain

- *Dalle carbonatée*
- *Reliefs volcaniques*
- *Rides sédimentaires*
- *Substrats Mixtes*

≠ compositions entre monts

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification géomorphologique

- Indices de variabilité du terrain (dérivés de la bathymétrie)
- Aspect, Rugosité, Pente, Courbure (éch. 30m)
 - BPI* (30m - 500m) → différentes échelles de structure

Classes manuelles de structure géomorphologique

- **Réfectivité** (roche/meuble)
- **Pente**
- **Validation terrain**

- *Dalle carbonatée*
- *Reliefs volcaniques*
- *Rides sédimentaires*
- *Substrats Mixtes*

≠ compositions entre monts

dex.

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification de la **nature du substrat sous BIIGLE 2.0**

Hétérogénéité du substrat à plus fine échelle (~m) ?

→ % composition substrat / image

Machine learning (*coll. Dr. T. Napoléon, C. Dugard et C. Carcopino*) (*ISEN Brest*).

5 classes de substrat:

- Roche volcanique
- Roche carbonatée
- Gravier
- Sédiment meuble
- Substrat biogénique

200 annotations/classe

Exemple d'un panel d'annotations de roche volcanique : Outil LARGO (Biigle)

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification de la **nature du substrat sous BIIGLE 2.0**

Hétérogénéité du substrat à plus fine échelle (~m) ?

→ % composition substrat / image

Machine learning (coll. Dr. T. Napoléon, C. Dugard et C. Carcopino) (ISEN Brest).

5 classes de substrat:

- Roche volcanique
- Roche carbonatée
- Gravier
- Sédiment meuble
- Substrat biogénique

200 annotations/classe

→ accuracy: **80-90%**

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification de la nature du substrat sous BIIGLE 2.0

Hétérogénéité du substrat à plus fine échelle (~m) ?

→ % composition substrat / image

Machine learning (coll. Dr. T. Napoléon, C. Dugard et C. Carcopino) (ISEN Brest).

5 classes de substrat:

- Roche volcanique
- Roche carbonatée
- Gravier
- Sédiment meuble
- Substrat biogénique

200 annotations/classe

Images	Graviers (%)	Roche_calc (%)	Roche_volc (%)	Sédiments (%)	Prédiction finale
170208034343.	27.2	0	7.5	65.4	Sédiments
170208042459.	23.2	0	0	76.8	Sédiments
170208042529.	45.2	0.9	0	53.9	Sédiments
170208042559.	7	1.8	0	91.2	Sédiments
170208042611.	33.8	6.6	0.4	59.2	Sédiments
170208042629.	18.9	0	0	81.1	Sédiments
170208042646.	63.2	13.6	0	23.2	Graviers
170208042659.	48.7	35.1	0	16.2	Graviers
170208042729.	1.3	1.3	0	97.4	Sédiments
170208042739.	3.1	0.4	0	96.5	Sédiments
170208042759.	7.5	8.3	3.5	80.7	Sédiments
170208042824.	14.9	0.4	0	84.6	Sédiments
170208042829.	21.5	0	0	78.5	Sédiments
170208042859.	81.6	1.3	0	17.1	Graviers
170208042918.	59.6	14.9	0	25.4	Graviers
170208042929.	74.6	1.3	0.9	23.2	Graviers
170208042953.	15.8	1.3	0	82.9	Sédiments
170208042959.	24.6	0.4	0	75	Sédiments
170208043029.	14	16.7	0	69.3	Sédiments
170208043059.	16.7	0.9	0	82.5	Sédiments
170208043129.	14.9	0.4	0	84.6	Sédiments
170208043159.	11	0.4	0.4	88.2	Sédiments
170208043217.	9.6	80.3	0.9	9.2	Roche calcaire
170208043229.	17.5	9.6	35.1	37.7	Sédiments
170208043259.	7.5	0	0	92.5	Sédiments
170208043316.	9.6	11	0	79.4	Sédiments
170208043330.	44.7	18.4	0	36.8	Graviers
170208043400.	0	0	0	100	Sédiments
170208043407.	23.7	6.6	12.7	57	Sédiments
170208043430.	0	0	0.9	99.1	Sédiments
170208043500.	26.8	30.3	0	43	Sédiments

Résultats des prédictions: format .csv

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification de la **nature et TAILLE** du substrat sous **BIIGLE 2.0**

Création d'un **catalogue de substrat** de référence:

- **Classes de taille** (d'après Wentworth, 1922) (pres/abs)

Bedrock

Cobbles + Sediment

Boulders + Sediment

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification de la **rugosité et pente** à très fine échelle (res. ~10cm)

Reconstruction en **Mosaïque 3D des transects** (*logiciel MATISSE 3D*) (*dev. A. Arnaubec, ifremer*).

Mosaïque 3D d'une portion de plongée. Mise en évidence des blocs rocheux volcaniques, sédiment, hétérogénéité du relief.

Méthodologie d'acquisition des données

Données environnementales

Quantification de la **rugosité et pente** à très fine échelle (res. $\sim 10\text{cm}$)

Reconstruction en **Mosaïque 3D des transects** (*logiciel **MATISSE 3D***) (*dev. A. Arnaubec, ifremer*).

Mesure: **rugosité (A)**, **pente (B)**
(*logiciel **CloudCompare***).

Méthodologie d'acquisition des données

Données **biologiques**

Classification et identification de la faune sur les images

Imagerie: **résolution taxonomique limitée**

Identification par « **morphotype** »

→ **Subjectivité, manque de cadre taxonomique**

→ MAIA: outil de machine learning pour la classification semi-automatique de la faune

1) Annotation géoréférencée à faible niveau taxonomique (Phylum, Classe)

Méthodologie d'acquisition des données

Données **biologiques**

Classification et identification de la faune sur les images

Imagerie: **résolution taxonomique limitée**

Identification par « morphotype »

→ **Subjectivité, manque de cadre taxonomique**

Réseau de taxonomistes.

Méthodologie complémentaire:

→ **Images + collectes d'organismes**

→ MAIA: outil de machine learning pour la classification semi-automatique de la faune

Catalogue d'espèces collectées

Order	family	genus	specificEpithe
Valvatida	Goniasteridae	Anthenoides	marleyi
Forcipulatida	Zoroasteridae	Zoroaster	sp.
Valvatida	Asterinidae	Paranepanthia	sp.
Notomyotida	Benthopectinidae	Cheiraster	sp.
Valvatida	Asterinidae	Nepanthia	sp.
Valvatida	Asterinidae	Nepanthia	sp.
Valvatida	Goniasteridae	Kasabaster	sp.
Spinulosida	Ec		
Valvatida	As		

Inventaire

Photo-taxa

1) Annotation géoréférencée à faible niveau taxonomique (Phylum, Classe)

2) Précision des identifications à l'aide des échantillons collectés → outil *LARGO (Biigle)* de révision/classification des annotations

Méthodologie d'acquisition des données

Données biologiques

Classification et identification de la faune sur les images

Imagerie: **résolution taxonomique limitée**

Identification par « morphotype »

→ **Subjectivité, manque de cadre taxonomique**

→ MAIA: outil de machine learning pour la classification semi-automatique de la faune

Réseau de taxonomistes.

Méthodologie complémentaire:

→ **Images + collectes d'organismes**

Forcipulatida Zoroasteridae Zoroaster

Situation géographique : SE

Zoroaster sp (DW4864)

Order	family	genus	specificEpithe
Valvatida	Goniasteridae	Anthenoides	marleyi
Forcipulatida	Zoroasteridae	Zoroaster	sp.
Valvatida	Asterinidae	Paranepanthia	sp.
Notomyotida	Benthopectinidae	Cheiraster	sp.
Valvatida	Asterinidae	Nepanthia	sp.
Valvatida	Asterinidae	Nepanthia	sp.
Valvatida	Goniasteridae	Krøyeraster	sp.
Spinulosida	Eclypteroidea	Eclypteroidea	sp.
Valvatida	Asterinidae	...	...

Catalogue d'espèces collectées

Inventaire

Photo-taxa

Cibler des taxons favorables

Déterminer des critères diagnostiques (morpho., profondeur, substrat etc.)

1) Annotation géoréférencée à faible niveau taxonomique (Phylum, Classe)

2) Précision des identifications à l'aide des échantillons collectés → outil *LARGO (Biigle)* de révision/classification des annotations

3) Clés d'identification adaptées à l'imagerie

Méthodologie d'acquisition des données

Données biologiques

Clés d'identifications adaptées aux images.

Shrimps, prawns and lobster in the Mozambique Channel: identification key on images

(0a) **Most** swimming behavior, shrimps observed in the water column, **pleopods** very long and extending **laterally**. Antennal scale very broad and elongate ("V" shape quite visible). Red, orange purple body color pattern.

[Dendrobranchiata \(1\)](#)

***Third pereopod with chela, second abdominal pleuron overlapping first abdominal pleuron, never carrying eggs.**

(0b) Mostly walk near or on the bottom. **Pleopods** not very long and not extending **laterally**. Antennal scale not very broad and elongate. Sometimes also red body color pattern.

[Pleocyemata \(Caridea 9\)](#)

***Third pereopod without chela, second abdominal pleuron not overlapping first abdominal pleuron, carrying eggs after spawning.**

(0c) Mostly walk near or on the bottom. Thick, strong cylindrical carapace covered with spines/granules sometimes. Moderate to **large** body size. Absence of prominent rostrum. **Pereopods** simple, without claws (end with a simple curved dactyl) and first pair not enlarged. Broad well developed fan-shaped tail. A pair of enlarged and cylindrical antennal peduncle with long and whip-like antennal flagellum. Eyes protected by two strong frontal horns (frontal projection of the carapace). Abdominal segments smooth or with transverse grooves (complex structure of the abdomen).

[Achelata \(Palinuridae 20\)](#)

(1a) Always black eyes (be careful, sometimes some yellow aspect, because of underwater images light reflection), rostrum long.

2

(1b) Eyes black or white, rostrum short (shorter than eyes, with only 1 or 2, occasionally 3, rostral/postrostral teeth), shell **soft, thin**. Body orange to red and with no or indistinct banding, upper **antennular** flagella long.

[Benthescymidae \(Benthescymus\)](#)

Benthescymus indeterminabilis

(2a) Upper **antennular** flagella short, cervical groove often not to upper carapace. Body and antennal flagella always red/orange.

[Arctideidae \(3\)](#)

(2b) Upper **antennular** flagella long, cervical groove (can be difficult to see on images) long and extending to or near to upper carapace. Body pink to pale orange, antennal flagella white.

[Solenoceridae \(Uroliboides 8\)](#)

Holiporoides indeterminabilis

***4 species in the *holiporoides* genus: correspond to subspecies with specific geographic range, and only 2 are restrictive to the Mozambique Channel/ Madagascar area.**

Asterids in the Mozambique Channel: identification key on images

Vocabulary: R = Length from disc center to **apex** / r = length from disc center to edge of the disc

(0) Arms **six** or more. Disk small, separate from arms, extremely distinct so in most taxa.

(1)

(0') Arms Five. Disk small or large, continuous with arms indistinct, or **distinct**, forming pentagonal or near pentagonal shape in some ([Asterinidae](#), [Solasteridae](#)), or **stellate shape**.

(8)

(1) Arms moderately long, distinct, moderately thick, fleshy and elongate but R/r (ratio) less than 10, numbering six to 18. Lateral spines absent or present, if present not elongate but forming a rough outline along arm's **ventrolateral** edge in some taxa (e.g. [Solasteridae](#)). Disk small or large.

(4)

(1') Arms extremely elongate, tapering (= **fusilé**), $R/r > 15.0$, numbering six to 20. In some instances diameter of complete organism ranges between 30 to 60 cm (1 to 2 feet). Prominent, elongate spines present extending along lateral side of arm forming serial series. When viewed in situ, arms always extended into water currents, **up toward the water column**. Disk very small.

[Brisinoida \(Brisinoidae \(2 types\) and Freyellidae \(2\)\)](#)

(2) Lateral spines club shaped, prominent, but not needle-like (= **forme d'aiguille**). **Papulae** present on disk and arm surface. Color rich orange-red with white plates or pure orange. Arms always 12 or more. Present primarily 100-600 m settings. Difficult to identify family level without close evaluation of the specimen. Look similar to Crinoids, but for the [Brisinoidae](#), the mouth face up.

[Brisinaster or Mesodolia](#)

Brisinaster indeterminabilis

(2') Lateral spines needle-like, elongate. No **papulae** evident. Color orange, yellow to white. Arms six or more, sometimes at great length (up to 60 cm). Occurring to 6000 m depths.

[Freyellidae or Brisinoidae \(3\)](#)

(3) Arm surface covered by distinct ribs (**côtes**, nerves) along arms.

[Brisinoidae](#)

(3') Arm surface covered by flattened plates along arms, disk. In some cases, spines present along lateral surface but also **abaxial** surface. Color orange but also completely white in some species. One genus, [Freyellaster](#) consistently displays six rays (=arms).

[Freyellidae](#)

(4) Opening (= **osculum** = "trou") present directly center on disk. Arms six to 11. Surface covered by widely spaced, tissue covered **papulae** spines appearing club-shaped in appearance (**apparence de "clubs" ou "tiges blanches"**). These club-shaped spines convey a "fuzzy" ("duveteux") appearance to the surface. Skeleton with window-like spaces. Body appears thick with tapering arms. Primarily observed below 1000 m.

[Myxasteridae \(Astenactis or Myxaster\)](#)

Myxasteridae indeterminabilis

Intégration et export des données pour analyse et cartographie

Nouveau format d'export Biigle .csv :
matrice de communauté (faune) / matrice
environnementale (substrat)

Image	Filename	Unidentif	Leucosid	Parthenoj	Homola	Dendrobr	Caridea	Aristeida	Eumunidi	Pandalidi	Paguroid	Paguridac	Paguridac	Paguridac	Parapagu	Parapagu	Her
170208042739.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208042824.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208043059.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208043644.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0
170208043949.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044100.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044247.jpg	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170208044400.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044415.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044430.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208044500.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044900.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170208044914.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
170208044945.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208044959.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045030.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
170208045200.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045230.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045550.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208045600.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
170208045730.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208045930.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
170208050130.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
170208050400.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208050500.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208050600.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208050630.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208050709.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
170208050716.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208050730.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Intégration et export des données pour analyse et cartographie

Nouveau format d'export Biigle .csv :
matrice de communauté (faune) / matrice
environnementale (substrat)

Image	Filename	Unidentif	Leucosid	Parthenoj	Homola	Dendrobr	Caridea	Aristeida	Eumunidi	Pandalidi	Paguroid	Paguridac	Paguridac	Paguridac	Parapagu	Parapagu	Her
1702080427339.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208042824.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208043059.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208043644.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0
170208043949.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044100.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044247.jpg	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170208044400.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044415.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044430.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
170208044500.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044500.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170208044900.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170208044914.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
170208044945.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208044959.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045030.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
170208045200.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045230.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045550.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208045600.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
170208045730.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208045930.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
170208050130.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
170208050400.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208050500.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208050600.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208050630.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208050709.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
170208050716.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208050730.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Intégration du fichier .csv dans ArcGIS:
logiciel ADELIE (dev. O. Soubigou, ifremer)
→ calcul des densités de faune/polygone
100m2 + cartographie des habitats

Intégration et export des données pour analyse et cartographie

Nouveau format d'export Biigle .csv :
matrice de communauté (faune) / matrice
environnementale (substrat)

Image	filename	Unidentif	Leucosid	Parthenoi	Homola	Dendrobr	Caridea	Aristeida	Eumunidi	Pandalidi	Paguroid	Paguridac	Paguridac	Paguridac	Parapagu	Parapagu	He
170208042739.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208042824.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208043059.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208043644.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0
170208043949.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044100.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044247.jpg	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170208044400.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044415.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044430.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
170208044500.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208044900.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170208044914.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
170208044945.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
170208044959.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045030.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
170208045200.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045230.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208045550.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208045600.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
170208045730.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208045930.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208050130.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
170208050400.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
170208050500.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
170208050600.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
170208050630.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
170208050709.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
170208050716.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170208050730.jpg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Intégration du fichier .csv dans ArcGIS:
logiciel ADELIE (dev. O. Soubigou, ifremer)
→ calcul des densités de faune/polygone
100m2 + cartographie des habitats

Intégration du fichier .csv dans R: analyses statistiques
(écologie numérique des communautés)

Analyses en cours